

Секция 3. Технология продукции общественного питания

Как видно из таблицы наибольшее количество протопектина при данных условиях гидролизуется и переходит в раствор к моменту времени 240 мин.

На следующем этапе, что бы определить оптимальную продолжительность гидролиза была определена его глубина по формуле:

$$\Gamma = m/M * 100 \%,$$

где m – масса пектина в гидролизате, г.

M – масса протопектина в выжимках яблок сушеных, г.

Зависимость глубины гидролиза от продолжительности представлена на рисунке.




Рисунок – Зависимость глубины гидролиза протопектина выжимок яблок от продолжительности процесса.

Таким образом, очевидно, что максимальная глубина гидролиза (50 %) достигается через 210 минут от момента начала процесса.

УДК 664.126.4

ПЮРЕ ИЗ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ - КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

З.В. Василенко, Е.Е. Василькова, Э.М. Омарова

Могилевский государственный университет продовольствия, Беларусь

Одной из актуальных задач, стоящих перед пищевыми и перерабатывающими отраслями агропромышленного комплекса, является создание специализированных продуктов питания для различных групп населения, путём обогащения их функциональными компонентами.

В качестве функциональных компонентов чаще всего выступают пищевые волокна (пектиновые вещества, целлюлоза, гемицеллюлозы и др.). Известно, что пищевые волокна играют важную роль при переваривании и усвоении пищи в организме человека. Они оказывают положительное действие на сосуды, способствуют снижению уровня холестерина в крови, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, и многое другое.

В связи с этим поиск источников пищевых волокон и обогащение ими продуктов питания имеет актуальное значение. Одним из путей для решения этой проблемы, на наш взгляд, является использование сахарной свёклы при производстве продуктов питания.

Попытки использовать добавки из сахарной свёклы и отходов свеклосахарного производства в качестве источника пищевых волокон предпринимались и раньше. Однако, наличие в ткани сахарной свёклы фермента оксидазы, окисляющего пирокатехин и тирозин с интенсивным образованием тёмноокрашенных соединений – меланинов, снижают органолептическую оценку этих добавок.

В связи с этим, нами был разработан новый способ производства добавки из сахарной свёклы в виде пюре. Полученное пюре имеет хорошие органолептические показатели качества: золотистый цвет, слабо выраженный приятный запах, кисло-сладкий вкус и пастообразную консистенцию. В полученном пюре из сахарной свёклы содержится достаточно высокое количество пищевых волокон. Так, общее содержание пищевых волокон в пюре сахарной свёклы составляет 3,3% (14,4 г на 100 г сухого вещества). При этом количество пектиновых веществ – 1,5%, гемицеллюлозы составляют – около 1% и 0,9% приходится на целлюлозу. Кроме того, пюре отличается высоким содержанием сахаров – 18-19%.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет считать полученное пюре из сахарной свёклы ценным источником пищевых волокон и сахаров. Применение свекловичного пюре позволит не только обогатить продукты цennыми пищевыми веществами, но и снизить рецептурное содержание рафинированного сахара за счёт сахаров, входящих в состав растительной ткани сахарной свёклы.

УДК 637.661:641.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

*В.В. Гутиков, * Г.В. Дейниченко*

Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Украина

*Харьковский государственный университет питания и торговли, Украина

На основе разработанного нами полуфабриката ТУ 10.18 Украина 9-92 «Консервы из цельной крови убойных животных» предлагаем технологию приготовления блюда «Перец фаршированный любительский». С

Техника и технология пищевых производств